

Perekond brunnera

Brunnera

Perekonda brunnera kuulub 3 liiki, mis looduslikult kasvavad Vahemeremaade idaosas, Kaukaasiast, Väike-Aasiast kuni Lääne-Siberini.

Brunnerad on keskmise kõrgusega mitmeaastased rohttaimed. Neil on suured, karvased, enamasti südajad lehed. Õied on enamasti sinised, harvem valged, väikesed, paiknevad hõredates õisikutes. Õied meenutavad kuju poolest lõosilma õisi.

Brunneraid paljundatakse jagamisega kevadel pärast õitsemist või augusti lõpus. Seemned külvatakse oktoobris avamaale. Noored taimed hakkavad õitsema 2. kasvuaastal.

suurelehine brunnera

Brunnera macrophylla

Kõrgus: 30-60 cm

Õied: väikesed, sinised, kollase neeluga, paiknevad suures hõredas õisikus

Õitsemise aeg: mai I – juuni I

Lehed: juurmised suured, munajad või südajad, varrelehed väiksemad ja rootsuta, karekarvased

Kasvukuju: püstine, puhmikjas

Valgus: poolvarjuline, varjuline (õitseb vähe)

Muld: huumusrikas, parasniiske

Vahekaugus istutamisel: 30 cm



Pea meeles!

Brunnera ei talu täispäikeselisi ja kuivema mullaga kasvukoht.

Perekond kopsurohi *Pulmonaria*

Perekonda kopsurohi kuulub umbes 14 liiki, mis looduslikult kasvavad Euroopas. Eestis kasvab looduslikult 2 liiki.

Kopsurohud on madalad kuni keskmise kõrgusega roomava risoomiga karvased püsikud. Lehed on neil piklikud, terveservalised. Juurmised lehed on suured, pikarootsulised, varrelehed aga väiksemad, rootsutud. Õied paiknevad tipmises kaheks harunenud võnkõikus.

Kopsurohtu paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel. Seemned külvatase avamaale oktoobris. Noored taimed hakkavad õitsema 2.-3. kasvuaastal.

kirjulehine kopsurohi *Pulmonaria saccharata*

Kõrgus: 25-30 cm

Õied: lillakasroosad või valged

Õitsemise aeg: mai II – juuni II


Lehed: juurmised dekoratiivsed, hõbevalgete hajuvate laikudega, karekarvased

Kasvukuju: puhmikjas, laiuv

Valgus: poolvarjuline

Muld: huumusrikas, niiskemapoolne

Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm



punane kopsurohi *Pulmonaria rubra*

Kõrgus: 25-35 cm

Õied: helepunased, tueroosad

Õitsemise aeg: aprill III – juuni II

Lehed: pehmekarvased, helerohelised, juurmised suured, laisüstjad

Kasvukuju: puhmikjas, laiuv

Valgus: poolvarjuline

Muld: huumusrikas, niiskemapoolne

Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm



Pea meeles!

Kirjulehise kopsurohu õied vananedes tumenevad.

Perekond nabaseemnik *Omphalodes*

Perekonda nabaseemnik kuulub umbes 28 liiki, mis looduslikult kasvavad Euraasia paraskliimaga aladel ja Mehhikos.

Nabaseemnikud on madalakasvulised, ühe- või mitmeaastased, peamiselt karvased rohttaimed, mille lõosailma meenutavad õied paiknevad tipmises hõredas õisikus.

Nabaseemnikuid paljundatakse jagamisega ning võsunditega kevadel, pärast õitsemist või sügisel.

kevad-nabaseemnik *Omphalodes verna*

Kõrgus: 10-15 cm

Õied: taevassinised, valge neeluga, valged

Õitsemise aeg: mai I – juuni I

Lehed: munajad, helerohelised kuni piklikmunajad, juurmised pikarootsulised kodarikuna

Kasvukuju: puhmikjas, laiuv, pinda kattev

Valgus: poolvarjuline, varjuline (õitseb vähem)

Muld: huumusrikas, niiskemapoolne, lubjarikas

Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm



Pea meeles!

Kevad-nabaseemnik on väga hea pinnakattetaim varjulisematesse kohtadesse

Perekond varemerohi *Symphytum*

Perekonda varemerohi kuulub umbes 35 liiki, mis looduslikult kasvavad Vahemeremaades, Põhja-Aafrikas ja Kesk-Euroopas. Eesti looduses kasvab 1 liik.

Varemerohud on enamasti mitmeaastased kiirekasvulised rohttaimed. Kogu taim on karvane, lehed tumerohelised, juurmised suured, pikarootsulised, laisüstjad või munajad, teravatipulised. Õied kellukjad, valkjad, roosad, sinised, paiknevad kobarjates õisikutes.

Varemerohtu paljundatakse jagamisega ning seemnetega.

harilik varemerohi *Symphytum officinale*

Kõrgus: 50-100 cm

Õied: kellukjad, roosad kuni lillad, paiknevad kobarjates õisikutes

Õitsemise aeg: mai I – juuni I

Lehed: helerohelised, munajad kuni piklikmunajad, juurmised pikarootsulised kodarikuna

Kasvukuju: puhmikjas, laiuv

Valgus: poolvarjuline, varjuline

Muld: huumusrikas, parasniiske

Vahekaugus istutamisel: 30-40 cm



suureõieline varemerohi *Symphytum grandiflorum*

Kõrgus: 40 cm

Õied: kellukjad, kahvatukollased, roosakad või helelillad

Õitsemise aeg: juuni – august

Lehed: piklikmunajad, juurmised pikarootsulised kodarikuna

Kasvukuju: puhmikjas, laiuv

Valgus: poolvarjuline, varjuline

Muld: huumusrikas, parasniiske

Vahekaugus istutamisel: 40-50 cm



Pea meeles!

Varemerohi levib väga kergesti edasi.