

Perekond müürilill *Cymbalaria*

Müürilille perekonda kuulub 9 liiki, mis looduslikult kasvavad Vahemeremaades ja Lääne-Euroopas.

Müürililled on madalakasvulised, mitmeaastased, roomavad rohttaimed. Lehed on neil ümarsüdajad, hõlmised. Õied on väikesed, valged, lillad või roosad, paiknevad lehekaenaldes. Õiekroon on liitlehine, 2-huuleline, alumine huul kumer, suleb neelu, krooni tipp kõvera kannusega.

Müürililli paljundatakse jagamisega, varrepistikutega ja seemnetega.

harilik müürilill *Cymbalaria muralis*

Kõrgus: 5-10 cm

Õied: helelillad neelust kahe kollase laiguga, meenutavad lõvilõua õit, asetsevad üksikult pikal raol lehekaenaldes

Õitsemise aeg: mai III – september III

Lehed: ümarsüdajad, pikarootsulised, 5-7-hõlmalised, hõlmad ogaterava tipuga

Kasvukuju: roomav, pinda kattev

Valgus: päikeseline, poolvarjuline, varjuline

Muld: niiskemapoolne, kergem, kivine; varjus kuivemapoolne

Vahekaugus istutamisel: 20 cm



Pea meeles!

Müürililled on vastupidavad, vähenõudlikud taimed. Annab hästi isekülvi.

Müürilille võib kasvatada kivistel aladel, kuivmüüril.

Perekond mailane *Veronica*

Perekonda mailane kuulub ligikaudu 190 liiki, mis looduslikult kasvavad põhjapoolkera paraskliimaga aladel, harvem troopilistel aladel, mäestikes. Eestis kasvab 16 liiki.

Mailased on ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed, poolpõõsad või põõsad. Nad on väga mitmesuguse välimusega. Lehed on neil enamasti vastakud, harvem männasena või vahelduvad. Õied on sinised või valged, hara roosad või lillad. Õiekroon on neiljatine, ülemine kroonleht on teistest suurem.

Mailasi paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel ning seemnetega, mis külvatakse avamaale sügisel või kasvuhoonesse kevadel.

emajuurelaadne mailane *Veronica gentianoides*

Kõrgus: 30-50 cm

Õied: heleseinised, tumedate joonteda, pikaraolised, asetsevad pikas paljuõielises kobaras

Õitsemise aeg: mai III – juuni III

Lehed: juurmised kodarikuna, laisüstjad, läikivrohelised, terveservalised; varrelehed väiksemad, teravsüstjad

Kasvukuju: puhmikjas, püstine

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne ja liivane, lubjarikas

Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm



kassisaba *Veronica spicata*

Kõrgus: 30-50 cm

Õied: väikesed, lillakassinised, valged, tumeroosad, asuvad tihedas, pikas, paljuõielises, teravatipulises kobaras

Õitsemise aeg: juuni III – august III

Lehed: juurmised laisüstjad, peenelt täkilise servaga, paiknevad kodarikuna

Kasvukuju: puhmikjas, püstine

Valgus: päikeseline

Muld: vett hästi läbilaskev aiapoolne

Vahekaugus istutamisel: 25-30 cm



hall mailane***Veronica spicata* subsp. *incana* sün. *Veronica incana*****Kõrgus:** 10-30 cm**Õied:** väikesed, tumesinised, asuvad tihedas, paljuõielises, teravatipulises kobaras**Õitsemise aeg:** juuli – august**Lehed:** juurmised laisüstjad, peenelt täkilise servaga, paiknevad kodarikuna**Kasvukuju:** puhmikjas, püstine**Valgus:** päikeseline**Muld:** vett hästi läbilaskev aiapinn**Vahekaugus istutamisel:** 25-30 cm**Märkused:** kogu taim kaetud hallide, viltjate karvadega**pikalehine mailane*****Veronica longifolia*****Kõrgus:** 50-120 cm**Õied:** väikesed, valged, sinised, roosad**Õitsemise aeg:** juuli – august**Lehed:** juurmised kitsad, süstjad, hambulise servaga**Kasvukuju:** puhmikjas, püstine**Valgus:** päikeseline**Muld:** vett hästi läbilaskev aiapinn**Vahekaugus istutamisel:** 25-30 cm**virgiinia männasmailane*****Veronicastrum virginicum* sün. *Veronica virginica*****Kõrgus:** 120-150 cm**Õied:** sinised, valged, roosad, teravatipulises kobaras**Õitsemise aeg:** juuli – september**Lehed:** paiknevad varrel männasjalt, süstjad, tumerohelised, täkilise servaga**Kasvukuju:** puhmikjas, püstine**Valgus:** päikeseline, poolvarjuline**Muld:** vett hästi läbilaskev aiapinn**Vahekaugus istutamisel:** 25-30 cm**Märkused:** mõnikord paigutatakse lehtede asetuse tõttu eraldi perekonda (männasmailane)**Pea meeles!**

Mailased on vastupidavad taimed, kuid dekoratiivsuse säilitavad lühiajaliselt. Selletõttu on otstarbekas neid uuendada pärast iga 4-5 aasta möödumist.

Perekond vägihein

Verbascum

Perekonda vägihein kuulub ligikaudu 250 liiki, mis looduslikult kasvavad Euraasias, eriti Vahemeremaades. Eestis kasvab 2 liiki.

Vägiheinad on kahe- kuni mitmeaastased vahelduvate lehtedega, enamasti kõrgekasvulised rohttaimed, harvem poolpöõsad. Õied on neil tavaliselt kollased, asetsevad üksikult või pusadena pikas kobarjas või pöörisjas õisikus. Õied on viietised, peaaegu korrapärased.

Vägiheina paljundatakse seemnetega või juurepistikutega.

lilla vägihein *Verbascum phoeniceum*

Kõrgus: 30-60 cm

Õied: hele- kuni tumelillad, valged, roosad, pikas kobarjas õisikus

Õitsemise aeg: juuni I – juuli III

Lehed: juurmised suuremad, munajad, tumerohelised, lameda kodarikuna

Kasvukuju: puhmikjas, püstine

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne ja liivane või tavaline aiapool

Vahekaugus istutamisel: 25-30 cm

