

Perekond kuningakepp

Oenothera

Kuningakepi perekonda kuulub 80 liiki, mis looduslikult kasvavad Ameerikas.

Kuningakepid on enamasti ühe- või mitmeaastased rohttaimed lamavate või püstiste varte, vahelduvate lehtede ja neljatiste kollaste, valgete või roosade õitega.

Kuningakeppe paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel. Generatiivsel paljundamisel külvatakse seemned aprillis. Taimed tärkavad 2-3 nädalaga. Noored taimed hakkavad õitsema 2.-3. kasvuaastal.

missuuri kuningakepp

Oenothera missouriensis

Kõrgus: 15-20 cm

Õied: helekollased, veidi lehterjad

Õitsemise aeg: juuli I – sügiseste külmadeni

Lehed: süstjad, veidi nahkjad, läikivad

Kasvukuju: püstine, laiuv

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne, kivisem, hea veeläbilaskvusega

Vahekaugus istutamisel: 25-30 cm

Märkused: talvitub halvasti



hall kuningakepp

Oenothera fruticosa ssp. glauca

Kõrgus: 25-50 cm

Õied: kollased, veidi lehterjad, asuvad tipmises õisikus

Õitsemise aeg: juuni II – august III

Lehed: sianakasrohelistes, kevadel pruunikaspunased, munajassüstjad

Kasvukuju: püstine

Valgus: päikeseline

Muld: tavaline aiapool

Vahekaugus istutamisel: 25-30 cm



Pea meeles!

Kuningakepid on rikkaliku õitsemise tõttu väga head värviandjad.