

## Perekond aubrieeta

### *Aubrieta*

Aubrieeta perekonda kuulub 12 liiki, kes pärinevad Lõuna-Euroopast Iraanini.

Aubrieetad on madalad, padjandeid moosustavad igihaljad püsikud. Lehed on väikesed, enamasti karvased, hallikasrohelised. Õied on neljatised, lillakassinised, harvem roosad, lillakaspunased või valged, paiknevad hõredas väheste õitega kobarates.

Aubrieetasid paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel, varrepistikutega juunis-augustis. Harvem kasutatakse paljundamiseks seemneid, mis külvatakse märtsis-aprillis.

#### aedaubrieeta

##### *Aubrieta* × *cultorum*

**Kõrgus:** 10-20 cm

**Õied:** valge, roosa, punane, tumevioletjas

**Õitsemise aeg:** mai I - juuni III

**Lehed:** hallikasrohelised, karvadega kaetud, äraspidimunajad

**Kasvukuju:** laiuv, pinda kattev

**Valgus:** päikeseline

**Muld:** kerge, lubjarikas, rähkne kuid toitaainerikas muld, igihaljad

**Vahekaugus istutamisel:** 20 cm



#### harilik aubrieeta

##### *Aubrieta deltoidea*

**Kõrgus:** 8-12 cm

**Õied:** lillakassinised, läbimõõduga kuni 2 cm

**Õitsemise aeg:** mai II – juuni II

**Lehed:** väikesed, karvased, äraspidimunajad, hallikasrohelised, igihaljad

**Kasvukuju:** laiuv, pinda kattev

**Valgus:** päikeseline, poolvari

**Muld:** kerge, lubjarikas, rähkne kuid toitaainerikas muld, igihaljad

**Vahekaugus istutamisel:** 15-20 cm



### Pea meeles!

Aubrieetad tuleb ümber istutada pärast 6-8 aasta möödumist.

Nad on tundlikud liigniiskuse suhtes, sellepärast tasuks neid istutada kallakutele, mitte tasasele pinnale.

## Perekond hanerohi

### *Arabis*

Hanerohu perekonda kuulub 120 liiki, kes on levinud põhjapoolkera parasvöötme alal, Vahemeremaades kuni troopilise Aafrika mäetikeneni. Eesti looduses kasvab 2 liiki.

Hanerohud on madalad, padjandeid moosustavad igihaljad püsikud. Juurmise lehed on enamasti talbjad, paiknevad kodarikuna, varrelehed on rootsuta, kõrvakestega. Neljatised õied paiknevad kobarjas õisikus, on valged, kollakasvalged, roosad või lillad.

Hanerohtusid paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel, varrepistikutega juunis-augustis. Harvem kasutatakse paljundamiseks seemneid, mis külvatakse märtsis-aprillis.

#### alpi hanerohi

##### *Arabis alpina*

**Kõrgus:** 15-25 cm

**Õied:** valged, lõhnavad, sortidel roosad

**Õitsemise aeg:** aprill III – mai III

**Lehed:** rohelised, väheste karvadega, hambulise servaga, kodarikulehed talbjad, varrelehed pikliksüstjad

**Kasvukuju:** laiuv, pinda kattev

**Valgus:** päikeseline

**Muld:** tavline aiamauld

**Vahekaugus istutamisel:** 25 cm



#### kaukaasia hanerohi

##### *Arabis caucasica*

**Kõrgus:** 15-20 cm

**Õied:** valged, sortidel roosad

**Õitsemise aeg:** aprill III – juuni II

**Lehed:** hallikasrohelised, üksikute hõredate tömpide hammastega, juurmised lehed äraspidimunajad kuni piklikud, varrelehed alusel südajasnooljad, igihaljad

**Kasvukuju:** laiuv, pinda kattev

**Valgus:** päikeseline

**Muld:** tavaline aiamauld

**Vahekaugus istutamisel:** 25 cm



#### tähtkarvane hanerohi 'Variegata'

##### *Arabis ferdinandi-coburgi* 'Variegata'

**Kõrgus:** 5-10 cm

**Õied:** valged, kuni 20cm kõrgustes õisikutes

**Õitsemise aeg:** aprill III – juuni

**Lehed:** nahkjad, rohelised, valge servaga

**Kasvukuju:** laiuv, pinda kattev

**Valgus:** päikeseline

**Muld:** tavaline, kuivemapoolne aiamauld

**Vahekaugus istutamisel:** 25 cm



### Pea meeles!

Hanerohud muutuvad vananedes hõredaks ja inetuks ning varakevadine päike võib neid kahjustada. Vajab ümber istutamist pärast 5-6 aasta möödumist.